

ហានិភ័យនៃការប៉ះពាល់នៃថ្នាំ fentanyl ចំពោះ កម្មករនិយោជិត

កម្មករនិយោជិតអាចប៉ះពាល់ជាមួយថ្នាំ fentanyl តាមរយៈមូល ប៉ះស្បែក ការស្រូបចូល ការហិត ឬប៉ះនឹងភ្នែកសំរិលដូចជាភ្នែក ឬ ច្រមុះ។ កម្មករនិយោជិតទំនងជាកាន់តែប៉ះពាល់ជាមួយ fentanyl តាមរយៈការប៉ះពាល់ស្បែករយៈពេលខ្លី។ អ្នកឆ្លើយតបសង្គ្រោះ បន្ទាន់មានឱកាសតិចតួចបំផុតក្នុងការប៉ះពាល់ស្បែកតាមមធ្យោបាយ បែបគ្លីនិក។

ប្រសិនបើកម្មករនិយោជិតប្រើប្រាស់នីតិវិធីសមស្រប និងការ ប្រុងប្រយ័ត្នជាសកល នោះពួកគេទំនងជាមិនសូវត្រូវបានប៉ះពាល់ តាមរយៈការស្រូបចូល ការហិត ឬមូលឡើយ។

សញ្ញានៃការត្រូវជាតិថ្នាំ fentanyl រួមមាន៖

- ការរង្វង់ស្មារតី
- ប្រស្រីភ្នែក (កូនក្រមុំ) រួមតូច
- ពិបាកដកដង្ហើម ធ្លាក់ទឹកចិត្ត ឬការកង្រាត់
- ងងុយដេក
- ការបាត់បង់ស្មារតី
- ចង្កោរ/ក្អក

ក្នុងករណីមានការប៉ះពាល់នឹងថ្នាំ fentanyl និងការលេចចេញនូវ រោគសញ្ញាទាំងនេះ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ **(800) 222-1222** ដើម្បីនិយាយជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាំពុលរដ្ឋ Washington។

ការបង្ការ

ការបង្ការដោយការប្រើថ្នាំ fentanyl លើសដូសពាក់ព័ន្ធនឹងការ ប្រុងប្រយ័ត្នដូចជា៖

- ការចៀសវាងគ្រឿងញៀនលក់តាមផ្លូវទាំងអស់
- កុំលេបលើសពីដូសថ្នាំដែលបានកំណត់
- កុំលាយថ្នាំ
- ការពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអំពីជម្រើសនៃ ការគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់ផ្សេងទៀត
- ការមានថ្នាំ Narcan នៅលើដៃព្រោះវាជាការព្យាបាលបន្ទាន់ សម្រាប់ការប្រើលើសដូស។



សារវតារ

ការប្រើប្រាស់ និងប្រេវ៉ាឡង់នៃថ្នាំ fentanyl បានកើនឡើងយ៉ាង ខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាពួកគេ កំពុងប្រើថ្នាំ fentanyl ទេ។ ថ្នាំ Fentanyl មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំង ជាងហេរ៉ូអ៊ីន 50 ដង និងខ្លាំងជាងថ្នាំម៉ូរ្វីន 100 ដង។

លទ្ធភាពដែលមនុស្សផ្សេងទៀតនឹងប៉ះពាល់ដោយអចេតនា ជាមួយថ្នាំ fentanyl កើនឡើងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ និង វត្តមានរបស់វា។ និយោជិតអាចចាត់វិធានការសុវត្ថិភាពមួយចំនួន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប៉ះពាល់ថ្នាំ fentanyl។

តើថ្នាំ fentanyl គឺជាអ្វី?

ថ្នាំ Fentanyl គឺជាអាគ្រឿងសំយោគដ៏មានឥទ្ធិពលដែលស្រដៀង នឹងម៉ូរ្វីន។ វេជ្ជបណ្ឌិតបានចេញវេជ្ជបញ្ជាឱ្យវាសម្រាប់ការ ព្យាបាលការឈឺចាប់ស្រួចស្រាវ ប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ ខុសច្បាប់ និងចែកចាយនៅលើទីផ្សារដីកាថ្នាំព្យាបាលផងដែរ។ គ្រោះថ្នាក់នៃថ្នាំ fentanyl កើនឡើងនៅពេលដែលវាត្រូវបានគេ ប្រើជាមួយសារធាតុផ្សេងទៀត រួមមាន ហេរ៉ូអ៊ីន កូកាអ៊ីន និងមេត ហ្វីតាមីន។


DCYF មិនរើសអើង និងផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានកម្មវិធី និងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនស្មើគ្នា ដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយមិនគិតពីជនជាតិ ពណ៌សម្បុរ យេនឌ័រ សាសនា ជំនឿ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ស្ថានភាព អតីតយុទ្ធជន ឬមានពិការភាពផ្លូវកាយ ពិការភាពវិញ្ញាណ ឬពិការភាពផ្លូវចិត្តឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានច្បាប់ចម្លងដោយឥតគិតថ្លៃនៃការចេញផ្សាយនេះជាទម្រង់ ឬ ភាសាផ្សេងទៀត DCYF Constituent Relations (ទំនាក់ទំនងសំខាន់របស់ DCYF) តាមលេខ 1-800-723-4831 ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ communications@dcyf.wa.gov។

គ្រោះថ្នាក់នៃថ្នាំ Fentanyl

Washington State Department of CHILDREN, YOUTH & FAMILIES

ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព

- ចៀសវាងការញ៉ាំ ផឹកស្រា ផឹកបារី ឬប្រើបន្ទប់ទឹកនៅកន្លែងដែលថ្នាំ fentanyl ត្រូវបានគេដឹង ឬសង្ស័យ។
- បន្ទាប់ពីចាប់កាន់ផ្ទៃដែលកខ្វក់ សូមចៀសវាងយកដៃប៉ះភ្នែក មាត់ ឬច្រមុះ។
- ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការប៉ះពាល់ វាមិនត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើតេស្តដោយប្រើថ្នាំ fentanyl ឬថ្នាំដែលស្រដៀងនឹងថ្នាំ fentanyl ចំផុត។
- ចៀសវាងការធ្វើតេស្ត ឬសកម្មភាពចាប់កាន់ណាមួយដែលអាចបណ្តាលឱ្យថ្នាំ fentanyl ឆ្លងតាមខ្យល់ ហើយត្រូវការពាក់ PPE និងបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពបន្ថែមទៀត។
- បន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ថ្នាំ fentanyl ដែលអាចកើតមាន និងមុនពេលចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុ សូមលាងដៃជាមួយសាប៊ូ និងទឹកភ្លាម។
- កុំប្រើទឹកអូសាវើល ឬទឹកលាងដៃទៅលើ ស្បែកដែលឆ្លងមេរោគ។



រោគសញ្ញានៃការប្រើថ្នាំ fentanyl ហួសកម្រិត

រោគសញ្ញានៃការប្រើ fentanyl ហួសកម្រិតរួមមាន៖

- កង្វះចលនា
- ការឈ្លក់ដែលអាចកើតមាន
- សំឡេងស្រែក ឬស្រមុក
- មិនអាចភ្ញាក់បាន
- ស្បែកឡើងក្រដាក់ស្អិត
- ប្រស្រីភ្នែករួមតូច
- ការដកដង្ហើមយឺត ឬមិនដកដង្ហើម
- ការបាត់បង់ការសម្របសម្រួល
- បបូរមាត់ និងក្រចកឡើងខៀវ
- ការនិយាយឡុលៗជាប់គ្នាដឹក ឬច្របូកច្របល់

សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 911 ឬស្វែងរកជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រភ្លាមៗ ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាមាននរណាម្នាក់បានលេបថ្នាំ fentanyl ឬថ្នាំអាភៀនផ្សេងទៀត។ អ្នកណាដែលបង្ហាញរោគសញ្ញានៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំអាភៀនលើសកម្រិតគួរតែត្រូវបានផ្តល់ថ្នាំ Narcan។ ដោយពិចារណាថាតើថ្នាំ fentanyl អាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណា ជូនកាលត្រូវលេបថ្នាំ Narcan ជាច្រើនដុំសដើម្បីធ្វើឱ្យមនុស្សម្នាក់មានដង្ហើមដូចធម្មតារឺវិញ។

