

Riesgo de la exposición al fentanilo para los trabajadores

Un trabajador puede entrar en contacto con el fentanilo a través del pinchazo de una aguja, el contacto con la piel, la ingesta, la inhalación o el contacto con las membranas mucosas, como los ojos y la nariz. Es más probable que un trabajador entre en contacto con el fentanilo por breve contacto con la piel. El personal de respuesta a emergencias tiene una ínfima posibilidad de estar expuesto al contacto con la piel de forma clínicamente significativa.

Si los trabajadores siguen los procedimientos adecuados y toman las precauciones universales, es menos probable que estén expuestos a través de la ingesta, la inhalación o el pinchazo de una aguja.

Los signos de intoxicación por fentanilo incluyen:

- Desorientación
- Pupilas puntiformes
- Disnea, hipoventilación o paro respiratorio
- Somnolencia
- Desmayo
- Náuseas/vómitos

Ante un caso de exposición al fentanilo y la aparición de estos síntomas, llame al **(800) 222-1222** para hablar con el **Washington Poison Center (Centro de Control de Envenenamiento de Washington)**.

Prevención

Prevenir la sobredosis de fentanilo implica tomar precauciones, por ejemplo:

- Evitar todas las drogas ilegales
- Nunca tomar más de la dosis recetada de un medicamento
- Nunca mezclar drogas
- Hablar con su médico sobre otras opciones para manejar el dolor
- Tener a mano Narcan, ya que es un tratamiento de emergencia para la sobredosis.



Antecedentes

El uso y la prevalencia del fentanilo han aumentado considerablemente en los últimos años, en los que muchas personas no saben que están usando fentanilo. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina.

Las probabilidades de que otras personas se expongan accidentalmente al fentanilo aumenta a partir de su uso y presencia. Los empleados pueden poner en práctica algunas medidas de seguridad para reducir su riesgo de exposición al fentanilo.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un opioide sintético potente similar a la morfina. Los médicos lo recetan para el tratamiento de dolor agudo, pero también se ha recetado de forma ilegal y distribuido en el mercado negro como medicamento recreativo. El peligro del fentanilo aumenta cuando se usa con otras sustancias, incluidas heroína, cocaína y metanfetamina.


El DCYF no discrimina y provee acceso igualitario a sus programas y servicios a todas las personas sin tener en cuenta la raza, el color, el género, la religión, el credo, el estado civil, el país de origen, la orientación sexual, la edad, la condición de veterano o la presencia de cualquier discapacidad física, sensorial o mental.

Si quisiera obtener copias gratuitas de esta publicación en un formato o idioma alternativos, comuníquese con DCYF Constituent Relations (Relaciones Constituyentes de DCYF) al 1-800-723-4831 o envíe un correo electrónico a communications@dcyf.wa.gov.

DCYF PUBLICATION CWP_0107 SP (04-2023) Spanish



Los peligros del fentanilo



Washington State Department of
CHILDREN, YOUTH & FAMILIES

Precauciones de seguridad

- Evite comer, beber, fumar o usar el baño en áreas en las que se conoce o sospecha la presencia de fentanilo.
- Después de manipular superficies posiblemente contaminadas, evitar tocarse los ojos, la boca o la nariz.
- Para reducir el peligro de exposición, no se recomienda que haga pruebas en el lugar con fentanilo o drogas muy similares a este.
- Evitar hacer pruebas o actividades de manipulación que pudieran hacer que el fentanilo esté suspendido en el aire, y pida más equipo de protección personal (PPE) y personal calificado.
- Después de una posible exposición al fentanilo y antes de abandonar el lugar, lávese las manos con agua y jabón de inmediato.
- Nunca use lejía o desinfectante de manos en la piel infectada.



Síntomas de sobredosis de fentanilo

Los síntomas de una sobredosis de fentanilo incluyen:

- Falta de movimiento
- Posible atragantamiento
- Ruidos de gorgoteo o ronquidos
- Imposibilidad para recuperar el conocimiento
- Piel fría y sudorosa
- Pupilas diminutas
- Respiración lenta o ausente
- Pérdida de coordinación
- Labios y uñas azules
- Habla arrastrada o confusión

Llame al 911 o busque ayuda médica de inmediato si sospecha que alguien ha tenido una sobredosis de fentanilo u otro opioide. Se debe administrar Narcan a cualquier persona que exhiba síntomas de una sobredosis de opioides. Teniendo en cuenta la potencia que puede tener el fentanilo, a veces se requieren varias dosis de Narcan para que una persona vuelva a respirar con normalidad.

